

Troubles cognitifs légers et dépression gériatrique : comparaison de caractéristiques cliniques et analyse de l'évolution des patients vers la démence. Mild cognitive disorders and geriatric depression: comparison of clinical characteristics and analysis of the evolution of patients towards dementia

<https://www.neurodegenerationresearch.eu/survey/troubles-cognitifs-legers-et-depression-geriatrique-comparaison-de-caracteristiques-cliniques-et-analyse-de-levolution-des-patients-vers-la-demence-mild-cognitive-disorders-and-geriatric-depressio/>

Principal Investigators

Hudon, Carol

Institution

Université Laval

Contact information of lead PI

Country

Canada

Title of project or programme

Troubles cognitifs légers et dépression gériatrique : comparaison de caractéristiques cliniques et analyse de l'évolution des patients vers la démence. Mild cognitive disorders and geriatric depression: comparison of clinical characteristics and analysis of the evolution of patients towards dementia

Source of funding information

CIHR

Total sum awarded (Euro)

€ 330,255

Start date of award

01/04/2012

Total duration of award in years

Keywords**Research Abstract**

Un des enjeux de la recherche sur le vieillissement consiste à mieux cerner les différentes façons dont la maladie d'Alzheimer (MA) se développe. Dans ce domaine, il est reconnu que deux troubles augmentent particulièrement le risque de développer la MA chez les personnes âgées : (1) le trouble cognitif léger (TCL) et (2) la dépression majeure (DEP). Les gens avec TCL présentent un trouble de la mémoire dont la sévérité n'est pas suffisante pour rencontrer les critères de la MA et dans environ la moitié des cas, des symptômes dépressifs légers sont aussi présents. Quant aux personnes avec DEP, elles présentent principalement un trouble de l'humeur et souvent, des problèmes de mémoire sont aussi présents. Il existe donc plusieurs similitudes entre le TCL et de la DEP. Mais curieusement, très peu d'études ont vérifié dans quelle mesure ces deux troubles peuvent aussi différer. La recherche que nous réaliserons vise à mieux comprendre les similitudes et les différences entre le TCL et la DEP. Chez les personnes TCL, nous séparerons celles qui ont des symptômes dépressifs (TCL/D+) et celles qui n'en ont pas (TCL). Tous les groupes seront d'abord comparés quant à leur capacité à mémoriser de nouvelles informations. Ensuite, la nature des atteintes dans le cerveau sera comparée entre les groupes. Finalement, le risque d'évoluer vers la MA ou une autre démence sera déterminé et comparé entre chaque groupe. Nous formulons l'hypothèse que nos mesures révéleront d'importantes différences quant aux caractéristiques du TCL, du TCL/D+ et de la DEP. Ces résultats permettront de mieux comprendre les caractéristiques cliniques pouvant être observées chez différents groupes de personnes à risque de développer la MA. Par le fait même, notre étude contribuera à l'amélioration du diagnostic précoce de la MA.

Further information available at:**Types:**

Investments < €500k

Member States:

Canada

Diseases:

N/A

Years:

2016

Database Categories:

N/A

Database Tags:

N/A